

使用説明書

使用前に必ず本使用説明書を読み、注意事項を守って使用して下さい。

動物用医薬品

モキシハートタブ[®]KS 7.5

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシハートタブ[®]KS 15

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシハートタブ[®]KS 30

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシハートタブ[®]KS 60

(犬フィラリア症予防剤)

動物用医薬品

モキシハートタブ[®]KS 136

(犬フィラリア症予防剤)

本剤の主成分であるモキシデクチンは、*Streptomyces cyaneogriseus* が産生するマクロライド系化合物ネマデクチンの誘導体で、抗菌性はなく、広範な抗寄生虫活性があります。

本剤は、飼育履歴の分かる国産牛肉など嗜好性の高い原料を賦形剤に使用し、犬が吐き出さないで好んで摂取するように開発されたチュアブルタイプの錠剤です。1ヵ月1回の経口投与により犬糸状虫症を予防します。

【有効成分】

本剤1個中(約0.45g)

モキシハートタブKS 7.5	モキシデクチン	7.5 μg
モキシハートタブKS 15	モキシデクチン	15 μg
モキシハートタブKS 30	モキシデクチン	30 μg
モキシハートタブKS 60	モキシデクチン	60 μg
モキシハートタブKS 136	モキシデクチン	136 μg

【用法及び用量】

毎月1回、1ヵ月間隔で体重1kg当たりモキシデクチンとして2~4 μgを経口投与する。投薬期間は、蚊の発生後1ヵ月から蚊の発生終息1ヵ月後までの間とする。

【効能又は効果】

犬：犬糸状虫の寄生予防

【使用上の注意】

【一般的注意】

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (3) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

【使用者に対する注意】

誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

【犬に対する注意】

1. 制限事項

- (1) 本剤の投与前には健康状態について検査し、異常のある犬には投与しないこと。
- (2) 本剤の投与前に必ず血液検査を行い、マイクロフィラリアがないことを確認した後、投与を行うこと。
- (3) 本剤の投与前には犬糸状虫感染の有無を集虫法、抗原検査法等により検査し、犬糸状虫感染犬に投与する場合は、成虫及びマイクロフィラリアを駆除するなど適切な処置を行い、慎重に投与すること。
- (4) 本剤は離乳前の子犬には投与しないこと。

2. 副作用

- (1) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2) 本剤を犬糸状虫寄生犬に投与したとき、大静脈症候群、元気消失、食欲不振などが現れることがある。
- (3) 本剤の投与により、まれに嘔吐、下痢、ふるえ、けいれんを起こすことがある。

3. 適用上の注意

本剤は、犬糸状虫成虫には効果がないため、成虫駆除を目的として使用しないこと。

【取扱い上の注意】

- (1) 本剤の外観又は内容物に異常が認められた場合は使用しないこと。
- (2) 本剤は分割投与しないこと。
- (3) 本剤は有効期間を設定してある動物用医薬品なので使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。

【その他の注意】

コリー犬及びその系統の犬種において、アベルメクチン系薬剤によって、神経毒性を示したとの報告がある。

【有効期間】

36カ月

注意—獣医師等の処方せん・指示により使用すること。

【貯法】

直射日光及び高温を避けること。

【包装】

モキシハートタブKS 7.5	6錠×10シート
モキシハートタブKS 15	6錠×10シート
モキシハートタブKS 30	6錠×10シート
モキシハートタブKS 60	6錠×10シート
モキシハートタブKS 136	6錠×10シート

販売

 **共立製薬株式会社**
東京都千代田区九段南1-5-10

製造販売元

 **フジタ製薬株式会社**
東京都品川区上大崎2-13-2