

2017年10月改訂（第7版）

指定

貯法 室温保存、気密容器

動物用医薬品

承認指令書番号 24動薬第1531号

テトラサイクリン系抗生物質製剤

指定医薬品 使用基準

水産用QTC20%散「KS」

オキシテトラサイクリンアルキルトリメチルアンモニウムカルシウム塩散

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、テトラサイクリン系抗生物質であるオキシテトラサイクリンアルキルトリメチルアンモニウムカルシウム塩を有効成分とする養殖魚類の経口投与剤です。

本剤は、広範囲な抗菌スペクトルを有する抗生物質製剤です。吸収性も良く、各臓器・組織に広く分布して有効濃度が長時間維持されます。

【成分及び分量】

本品 1 g 中

有効成分	含量
オキシテトラサイクリンアルキルトリメチルアンモニウムカルシウム塩	200 mg(力価)

【効能又は効果】

オキシテトラサイクリン感受性菌による下記疾病魚類の死亡率の低下
スズキ目魚類：連鎖球菌症、ビブリオ病
カレイ目魚類：連鎖球菌症

【用法及び用量】

魚体重 1 kg 当たり、1 日量オキシテトラサイクリンとして次の量を餌料に均一に混ぜて投与する。

スズキ目魚類：50 mg (力価) [本品として 0.25 g]
カレイ目魚類：50 mg (力価) [本品として 0.25 g]

<1日当たりの魚体重別本品投与量>

魚体重 (kg)	本品投与量 (g)
10	2.5
100	25
200	50
300	75
400	100
500	125
1,000	250

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は、スズキ目魚類の連鎖球菌症、ビブリオ病及びカレイ目魚類の連鎖球菌症を治療するために使用し、スズキ目魚類若しくはカレイ目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。
- 本剤は、適切な量で使用しないと期待される治療効果が得られず、これを超えて使用した場合には、思わぬ副作用が発生するおそれがあることから、定められた用法及び用量に従って正しく使用すること。
- 本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。
また、治療効果の有無にかかわらず、8日間以上の連続投与は避け、繰り返し使用しないこと。
- 本剤は、指導機関（家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等）に相談の上使用すること。
- 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物（すずき目魚類、かれい目魚類）について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

すずき目魚類：食用に供するため水揚げする前20日間
かれい目魚類：食用に供するため水揚げする前40日間

(使用者に対する注意)

- 本剤の取扱い時には、保護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用し、粉じん等を吸い込まないよう注意すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- 本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。
- 本剤は、小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 使用済みの空容器等は、地方公共団体条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。
- 本剤を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い適切に処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- オキシテトラサイクリンには、起炎性があるとの文献報告があることから、取扱いに際しては眼や皮膚に付着しないよう注意すること。もし、本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。
- オキシテトラサイクリンには、ヒトや実験動物に対する催奇形性に関する報告があるので、妊娠中の女性が投与作業を行う場合は注意すること。

(取扱い上の注意)

- 開封後は速やかに使用すること。
- 本剤は、よく振り混ぜてから使用すること。

【薬理学的情報等】

(薬物動態)

各魚種にオキシテトラサイクリンとして 50 mg (力価)/kg を経口投与した場合の薬物動態パラメーターは次表のとおりとなった。

魚種	体重 (g)	水温 (°C)	t _{max} (時間)	C _{max}	AUC ₄₈
ブリ	135	22	4	0.65*	8.0*
ヒラメ	433	24	4	0.21*	6.8*

* C_{max}単位：μg(力価)/mL、AUC単位：μg(力価)·hr/mL

(薬効薬理)

オキシテトラサイクリンは、微生物のリボゾームの30Sサブユニットに結合し、リボゾームに対してアミノアシルtRNAが結合するのを阻害することでタンパク質合成を抑制し、静菌的に作用する。

【包装】

10 kg (1 kg × 10 分包)

【製品情報お問い合わせ先】

共立製薬株式会社 学術

〒102-0073

東京都千代田区九段北一丁目11番5号

TEL:03-3264-7559

製造販売業者

共立製薬株式会社
東京都千代田区九段南 1-5-10

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

MPQ07-A1710