

ヒノキチオール配合外用剤

## メナドン®

## 【本質の説明又は製造方法】

本剤はウイルスが原因で生じる乳頭腫の除去を目的として、角質溶解腐食作用をもつ乳酸、角質軟化作用のサリチル酸、殺菌消毒作用のヒノキチオールを配合した製剤です。

## 【成分及び分量】

本品 300 mL中

有効成分	含量
サリチル酸	5 g
ヒノキチオール	500 mg
乳酸（C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub> として）	20 g

## 【効能又は効果】

牛：乳頭腫

## 【用法及び用量】

1日2回筆を用いて患部に適量を塗布し、腫瘍が脱落するまで連用する。

## 【使用上の注意】

## （基本的事項）

## 1. 守らなければならないこと

## （一般的注意）

- ・本剤は、効能・効果において定められた目的のみに使用すること。
- ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は、獣医師の指導の下で使用すること。

## （牛に関する注意）

- ・本剤を乳房、乳頭に塗布する場合には、搾乳後に使用すること。

## （取扱い及び廃棄のための注意）

- ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。
- ・換気の良い場所あるいは屋外で使用すること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

## 2. 使用に際して気を付けること

## （使用者に対する注意）

- ・誤って薬剤を飲みこんだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤が眼に入った場合には、直ちに水で洗眼し、速やかに医師の診察を受けること。
- ・本剤が皮膚に付着した場合には、直ちに水で洗い流すこと。

## （牛に関する注意）

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

## （取扱い上の注意）

- ・開封後は速やかに使用すること。

## （専門的事項）

## その他の注意

- ・本剤の有効成分であるサリチル酸は、経口又は腹腔内投与によるラットの動物実験で、催奇形性作用が認められたとの報告がある。
- ・本剤は実験動物において変異原性を示したとの報告がある。

## 【包装】

300 mL（ガラス容器）


## 【製品情報お問い合わせ先】

共立製薬株式会社 学術  
〒102-0073  
東京都千代田区九段北一丁目11番5号  
TEL:03-3264-7559

## 【火気厳禁】

危険物第四類  
第一石油類  
危険等級Ⅱ  
2-プロパノール  
ジメチルスルホキシド  
水溶性

製造販売業者

 共立製薬株式会社  
東京都千代田区九段南1-6-5

®登録商標

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所（<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>）にも報告をお願いします。