

牛の尿石症の治療・予防用経口剤

リゾストン

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、有効成分の重質炭酸カルシウムにより肥育牛の体液中Ca/P比の不均衡を防止し、リン酸塩性尿結石に対し治療と予防効果を発揮します。
また、塩化アンモニウムにより尿のアルカリ化を抑制し結石の成長も防ぎます。

【成分及び分量】

本品100 g中

有効成分	含量
塩化アンモニウム	40 g
重質炭酸カルシウム (カルシウムとして)	40 g (16 g)

【効能又は効果】

牛：尿石症の治療及び予防

【用法及び用量】

治療：1日1回体重1 kg当たり0.125 gを3～7日間経口投与する。
予防：1日1回体重1 kg当たり0.025～0.05 gを連日経口投与する。

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は、獣医師の指導の下で使用すること。

(使用者に対する注意)

- ・飼料等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

(牛に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(取扱い上の注意)

- ・開封後は速やかに使用すること。

【薬理学的情報等】

(薬効薬理)

- ・重質炭酸カルシウムは胃酸により溶解して腸管から吸収された後、尿中に排泄され、尿石の元となるリン酸とマグネシウムの結合を抑制・防止する。
- ・塩化アンモニウムは尿中で陰イオンとして尿を酸性化し、リン酸とマグネシウムの結晶化を防ぐ。

【包装】

1 kg (50 g × 20)
20 kg

【製品情報お問い合わせ先】

共立製薬株式会社 学術
〒102-0073
東京都千代田区九段北一丁目11番5号
TEL:03-3264-7559

製造販売業者

 共立製薬株式会社
東京都千代田区九段南 1-6-5

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。