


動物用医薬品

エレクトロプラス® A

経口用電解質製剤



46.74g



製造販売業者
共立製薬株式会社
東京都千代田区九段南 1-6-5
®登録商標

2022年7月改訂(第9版)

貯法 室温保存、気密容器

承認指令書番号 26 動薬第 304 号

【成分及び分量】

本品 1 袋 (46.74g) 中

有効成分	含量
ブドウ糖	21.61g
グリシン	9.00g
クエン酸三ナトリウム(無水)	6.88g
塩化ナトリウム	7.01g
塩化カリウム	2.24g

【効能又は効果】

子牛の下痢時の脱水症の改善及び電解質の補給

【用法及び用量】

子牛 1 頭当たり 1 回量として 46.74g を 2L の微温湯に溶解し、1 日 2 回、1～3 日間経口投与する。

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
- 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤を投与する場合、最初の 2 日間は全乳又は代用乳の給与を中止すること。3 日目以降は、本剤溶解液と代用乳等との等量混合液を投与すること。
- (取扱い及び廃棄のための注意)
- 本剤は用時溶解して投与すること。
- 本剤に変色の認められた場合には使用しないこと。
- 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。

- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- (牛に関する注意)
- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

【薬理学的情報等】

(薬物動態)

エンテロトキシンによる下痢症では、電解質溶液は経口投与しても吸収しないが、ブドウ糖又はアミノ酢酸を配合することで電解質の吸収を助け、その結果水もよく吸収される。

(臨床成績)

臨床試験において、下痢症によって脱水症状を呈した 13～30 日齢の子牛 6 頭に、本剤を 1 日 1～2 回投与した結果、1～2 日目に全て回復した。

【製品情報お問い合わせ先】

共立製薬株式会社 学術
〒102-0073
東京都千代田区九段北一丁目 11 番 5 号
TEL : 03-3264-7559

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

ELP09-J2207